

FORICA

濃厚流動食

流動食品A・流動食品C・NT-5



ホリカフーズ株式会社

天然食品を原料とした濃厚流動食

流動食品A

100ml当たり

たんぱく質
5.1g

食物繊維
0.5g

ビオチン
4μg

セレン
6μg



- 1972年(昭和47年)販売を開始しました。
- 牛乳、にんじん、米、卵パウダー、パン粉、粉末状大豆たん白を使用しています。
- 1200mlで日本人の食事摂取基準(2015年版)男性50~69歳1日あたりの推奨量または目安量のV.A、V.B1、V.B2、ナイアシン、V.B12、パントテン酸、ビオチン、Ca、セレンをおおむね充足できます。



流動食品C

100ml当たり

たんぱく質
3.9g

食物繊維
2.4g


ビオチン
0.9μg

+ 5種の微量元素




- 1982年(昭和57年)販売を開始しました。
- 流動食品Aで乳糖不耐症(乳糖O)やミネラル不足、に対応した商品として発売しました。
- 米、大豆油、大豆ペースト、にんじん、粉末状大豆たん白、卵パウダーを使用しています。
- 800mlで日本人の食事摂取基準(2015年版)男性50~69歳1日あたりの推奨量または目安量をおおむね充足できるように調整をしています。
- ・ビタミン(V.A、V.D、V.E、V.B1、V.B2、ナイアシン、V.B6、V.B12、葉酸、パントテン酸、V.C)
- ・ミネラル(Ca、Mg、Fe)、微量元素(亜鉛、銅、セレン、クロム、モリブデン)

エネルギー構成比



標準脂肪酸組成



7種の微量元素を配合した半消化態流動食

NT-5

100ml当たり

たんぱく質
5.1g


食物繊維
1.1g

ビオチン
7μg

+ 7種の微量元素



- 主なビタミン、ミネラルを800mlで日本人の食事摂取基準(2015年版)男性50~69歳1日あたりの推奨量または目安量をおおむね充足できるように調整をしています。
- たんぱく質は乳たんぱく・カゼインナトリウムを使用しています。
- 糖質は低分子デキストリンを使用しています。
- 脂質は不飽和脂肪酸の多い大豆油・オレイン酸の多いオリーブ油・α-リノレン酸の多いしそ油及びMCT(中鎖脂肪酸)をバランスに配慮し配合しています。
- 食物繊維は不溶性食物繊維(結晶セルロース)・水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)の割合を2:8に調整をしています。



標準アミノ酸組成(100ml中)

	流動食品A	流動食品C	NT-5		流動食品A	流動食品C	NT-5
ヒスチジン	g 0.13	0.131	0.14	アルギニン	g 0.20	0.213	0.17
イソロイシン	g 0.24	0.214	0.26	アラニン	g 0.19	0.159	0.16
ロイシン	g 0.44	0.407	0.51	アスパラギン酸	g 0.40	0.384	0.39
リジン	g 0.34	0.323	0.40	グルタミン酸	g 0.96	0.943	1.18
メチオニン	g 0.12	0.104	0.14	グリシン	g 0.13	0.120	0.10
シスチン	g 0.08	0.037	0.03	プロリン	g 0.40	0.404	0.57
フェニルアラニン	g 0.24	0.233	0.28	セリン	g 0.26	0.253	0.30
チロシン	g 0.18	0.198	0.26				
スレオニン	g 0.20	0.189	0.23				
トリプトファン	g 0.07	0.058	0.06				
バリン	g 0.29	0.267	0.35				
必須アミノ酸 計	g 2.33	2.161	2.66	非必須アミノ酸 計	g 2.54	2.476	2.87
				全アミノ酸 合計	g 4.87	4.637	5.53

	流動食品A	流動食品C	NT-5
必須アミノ酸/全アミノ酸	0.48	0.47	0.48
必須アミノ酸/非必須アミノ酸	0.92	0.87	0.93
アミノ酸価	100	100	100
Fischer比	3.13	2.8	2.84
NPC/N	102	143	106
n-6/n-3	22.3	7.5	4.4

性状値(20℃)

	流動食品A	流動食品C	NT-5
浸透圧	496mOsm/ℓ	395mOsm/ℓ	393mOsm/ℓ
粘度	45mPa・s	41mPa・s	11mPa・s
pH	6.6	7.1	6.8
比重	1.075	1.080	1.080

■ 荷姿／規格

商 品 名	流動食品A	流動食品C	NT-5	
賞 味 期 間	製造日より12ヵ月	製造日より12ヵ月	製造日より12ヵ月	製造日より12ヵ月
J A N コ ー ド	4977113691004	4977113691103	4977113691202	4977113691257
G T I N コ ー ド	14977113691001	14977113691100	04977113691202	04977113691257
荷 姿	200ml×30袋	200ml×30袋	200ml×30袋	300ml×30袋
内 容 量	200ml	200ml	200ml	300ml
単 品 寸 法	W105×D45×H165mm	W105×D45×H165mm	W105×D45×H165mm	W120×D58×H190mm
単 品 重 量	225g	225g	225g	335g
ケ ー ス 寸 法	L355×W215×H180mm	L355×W215×H180mm	L355×W215×H180mm	L425×W240×H200mm
ケ ー ス 重 量	7.0kg	7.0kg	7.0kg	10.5kg
原 材 料 名	牛乳(国産)、にんじん、脱脂粉乳、マルトース、デキストリン、米、卵パウダー、パン粉、乳たん白、植物油脂、粉末状大豆たん白、食塩/クエン酸塩(Na,K)、結晶セルロース、V.C、ナイアシン、V.B ₁ (一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)	マルトデキストリン(国内製造)、米、難消化性デキストリン、大豆油、大豆ペースト、にんじん、粉末状大豆たん白、ドロマイト、卵パウダー、食塩、酵母/トレハロース、カゼインNa、結晶セルロース、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B ₁ 、V.B ₆ 、V.B ₂ 、V.A、葉酸、V.K、V.D、V.B ₁₂ (一部に卵・乳成分・大豆を含む)	粉あめ、乳たん白、大豆油、難消化性デキストリン、中鎖脂肪、オリーブ油、食塩、ドロマイト、しそ油、酵母、乳酸菌/カゼインNa、トレハロース、クエン酸塩(K,Na)、結晶セルロース、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B ₆ 、V.B ₁ 、β-カロチン、V.B ₂ 、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B ₁₂ 、(一部に乳成分を含む)	
アレルギー28品目	小麦、卵、乳、大豆	卵、乳、大豆	乳	

■ 栄養成分値（100ml当たり）

	流動食品A	流動食品C	NT-5
エネルギー	104 kcal	105 kcal	104 kcal
水分	84.0 g	83.8 g	83.6 g
たんぱく質	5.1 g	3.9 g	5.1 g
脂質	2.7 g	2.2 g	2.7 g
炭水化物	14.7 g	17.3 g	15.6 g
糖質	14.2 g	14.9 g	14.5 g
食物繊維	0.5 g	2.4 g	1.1 g
灰分	1.0 g	0.8 g	1.0 g
ナトリウム	130 mg	170 mg	160 mg
カリウム	170 mg	13 mg	220 mg
カルシウム	110 mg	89 mg	65 mg
マグネシウム	14 mg	46 mg	38 mg
リン	110 mg	40 mg	46 mg
鉄	0.4 mg	1.2 mg	1.4 mg
亜鉛	0.5 mg	1.5 mg	1.9 mg
銅	0.03 mg	0.14 mg	0.30 mg
マンガン	0.07 mg	0.06 mg	0.60 mg
ヨウ素	検出せず	検出せず	22 μg
セレン	6 μg	5 μg	12 μg
クロム	0 μg	3 μg	5 μg
モリブデン	検出せず	6 μg	6 μg
塩素	220 mg	160 mg	140 mg
イオウ	0.05 g	0.03 g	0.04 g
ビタミンA	120 μgRAE	96 μgRAE	100 μgRAE
ビタミンD	0 μg	1.1 μg	1.0 μg
ビタミンE	0.3 mg	1.3 mg	1.2 mg
ビタミンK	1 μg	5 μg	3 μg
ビタミンB ₁	0.18 mg	0.21 mg	0.16 mg
ビタミンB ₂	0.18 mg	0.17 mg	0.22 mg
ナイアシン	2.25 mgNE	3.76 mgNE	1.7 mgNE
ビタミンB ₆	0.05 mg	0.17 mg	0.18 mg
ビタミンB ₁₂	0.3 μg	0.39 μg	0.4 μg
葉酸	11 μg	31 μg	33 μg
パントテン酸	0.44 mg	0.86 mg	0.70 mg
ビオチン	4 μg	0.9 μg	7 μg
ビタミンC	3 mg	23 mg	9 mg
コリン	0.04 mg	検出せず	0 mg
乳糖	4 g	検出せず	検出せず
食塩相当量	0.3 g	0.4 g	0.4 g

推定値

■ 使用上の注意

- 容器包装に、漏れ・膨張等がみられるものは使用しないでください。
- 開封前によく振ってからご使用ください。
- 開封時、内容物の色・味・臭い等に異常がみられた場合には使用しないでください。
- 開封後は早めに使用し、使い残りは保管しないでください。
- 体温程度に加温するときは、そのまま温湯に入れてください。直火で加熱しないでください。
- 酸味の強い果汁や消化剤などを加えると凝固したり、分離することがあります。
- 初めてご使用になる場合には、低濃度、少量から始め栄養補給をうける方の状態に合わせて、徐々に濃度及び量を上げてください。
- 経管投与する際には、細菌汚染の心配がありますので、衛生的な器具、器材をご使用ください。
- 経管投与の際には医師及び栄養士の指導のもとでご使用ください。
- 静脈内へは絶対に投与しないでください。
- 長期投与により、電解質・ビタミン及び微量成分等が不足する可能性がありますので、必要に応じて補給してください。
- 本品を使用中何らかの異常が認められた場合には、ただちに使用を止め、医師・薬剤師または栄養士にご相談ください。

■ 保管上の注意

本品は常温で保存できますが、凍結するような場所や直射日光のあたる場所を避け、なるべく冷暗所で保存してください。

FORICA
ホリカフーズ株式会社

東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東2-9-4 (明治安田生命秋葉原昭和通りビル9階)
TEL 03-5846-5096 FAX 03-5846-5095

関西営業所
〒577-0012 大阪府東大阪市長田東3-2-43 (SKパークビル7階)
TEL 06-6746-1616 FAX 06-6746-1818

新潟営業所
〒949-7411 新潟県魚沼市大石59-1
TEL 025-794-5536 FAX 025-794-4404

ホームページ：http://www.foricafoods.co.jp